

がい よう ばん
概要版

詳しく知りたい方向けの詳細版もあります。

小学校6年 ~ **高校1年^{相当}** の女の子と
保護者の方へ大切なお知らせ



HPVワクチンについて知ってください
～あなたと関係のある“がん”があります～

ウイルス感染でおこる子宮けいがん

詳細版
P2~3

「がんってたばこでなるんでしょ？」

「オトナがなるものだから私は関係ない」って思っていますか？

実はウイルスの感染がきっかけでおこる“がん”もあります。その1つが子宮けいがんです。

HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。

このウイルスは、女性の多くが“一生に一度は感染する”といわれるウイルスです*。

感染するとほとんどの人は時間がたつと検査では見つからなくなりますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。

現在、感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。

*HPVは一度でも性的接触せつしよくの経験があればだれでも感染する可能性があります。



女性の多くがHPV(ヒトパピローマウイルス)に
“一生に一度は感染する”といわれる

がんになる場合も

感染を防ぐことが
がんにならないための手段


<何人くらいが子宮けいがんになるの?>

日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮けいがんになり、毎年、約3,000人の女性が亡くなっています。
患者さんは20歳代かんじゃから増え始めて、30歳代までさいにがんの治療ちりょうで子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約900人います。

<一生のうち子宮けいがんになる人>

1万人あたり130人

2クラスに1人くらい




1クラス約35人の女子クラスとして換算かんさん

<子宮けいがんて亡くなる人>

1万人あたり31人

9クラスに1人くらい



HPVワクチンの効果

詳細版
P4

HPVの中には子宮けいがんをおこしやすい種類(型)のものが 있습니다。
HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。
現在日本において公費で受けられるワクチンは、9価ワクチン(シルガード®9)です。
子宮けいがんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぎ、
ほかの5種類※1のHPVの感染も防ぐため、子宮けいがんの原因の80~90%を防ぎます※2。
また、HPVワクチンでがんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、
がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

※1 HPV31型、33型、45型、52型、58型

※2 HPV16型と18型、31型、33型、45型、52型、58型まで含めると、子宮けいがんの原因の80~90%を占めます。

HPVワクチンのリスク

詳細版
P5

筋肉注射という方法で注射します。接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状しょうじょうが起こることがあります。
頻度は不明ですが、重い副反応(アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、
免疫性血小板減少症)※1が起こることがあります。
また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動ふずいいうんどう※2といった多様な症状が報告されています。
ワクチンが原因となったものかどうかわからないものをふくめて、
接種後に重篤な症状じゅうとく※3として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたり約2人です。
接種する年齢によって、合計2回または3回接種しますが、
接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。
接種後に気になる症状が出たときは、まずはお医者さんや周りの大人に相談してください※4。

※1 アナフィラキシー:呼吸困難、じんましん等、ギラン・バレー症候群:手足の力が入りにくい等、急性散在性脳脊髄炎(ADEM):頭痛、嘔吐、意識低下等、免疫性血小板減少症:紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等

※2 動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと

※3 重篤な症状には、入院相当以上の症状などがふくまれています。報告した医師や企業の判断によるため、必ずしも重篤でないものも重篤として報告されることがあります。

※4 HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関をお住まいの都道府県ごとに設置しています。

子宮けいがんで苦しまないために、できることが2つあります

詳細版
P7

① 今からできること

日本では、小学校6年~高校1年相当の女の子を対象に、
子宮けいがんの原因となるHPVの感染を防ぐ
ワクチンの接種を提供しています。

HPVの感染を防ぐことで、
将来の子宮けいがんを予防できると
期待されています。

カナダ、オーストラリアなどでは
女の子の8割以上がワクチンを受けています。



② 20歳さいになったらできること

HPVワクチンを
受けていても、
子宮けいがん検診けんしんは
必要です。
定期的に
検診を受けることが
大切です。



HPVワクチンについて知ってください

すべてのワクチンの接種には、効果とリスクとがあります。

まずは、子宮けいがん^{けいがん}とHPVワクチン、子宮けいがん^{けいがん}検診^{けんしん}について知ってください。
周りの人とお話ししてみたり、かかりつけ医などに相談することもできます。

HPVワクチンを受けることを希望する場合は


詳細版
P4.8

小学校6年～高校1年相当の女の子は、HPVワクチンを公費で受けられます*。

ワクチンを接種する年齢によって、接種の回数や間隔^{かんかく}が異なりますが、
半年～1年の間に決められた回数、接種します。

接種には、保護者の方の同意が必要です。

*公費の補助がない場合の接種費用は3回接種で8～10万円、2回接種で5～7万円です。



1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

HPVワクチンについて、もっと詳しく知りたい方は

このご案内の内容をもっと詳しく説明している
「HPVワクチンについて知ってください<詳細版>」や、
其他のご案内をご覧ください。

厚労省 HPV



HPVワクチンに関するよくあるご質問(Q&A)については、こちらをご確認ください。



お問合せ先

真岡市 健康福祉部 健康増進課 地域医療係

電話 : 0285-81-6946

e-mail : kenkou@city.moka.lg.jp